



Уважаемые Господа !

ООО «Махаон» осуществляет поставки средств химической защиты растений сельхозпроизводителям Ульяновской области.

Предлагаем Вашему вниманию прайс-лист по средствам химической защиты растений:

Препарат	Культура	Спектр действия	Норма расхода лит(кг) /га (тн)	Цена с НДС за ед. изм.	Примечание
Фунгициды					
Альто супер, КЭ (250 г/л) (Профи Супер)	Пшеница яровая, озимая, ячмень, сахарная свекла	Мучнистая роса, гельминтоспориоз, корневые гнили, предотвращение полегания, церкоспороз, альтернариоз	0,4-0,75	1045	Опрыскивание в период вегетации
Барьер Колор, КС (60 г/л)	Пшеница яровая, озимая, ячмень, рожь, овес	Твердая, пыльная головня, гнили, плесневение семян, септориоз	0,4-0,5	440	Протравливание семян
Кардон, КС (500 г/л)	Пшеница яровая, озимая, ячмень, рожь, овес	Твердая, пыльная головня, гнили, плесневение семян, септориоз, снежная плесень, полегание.	1-1,5.	407	Протравливание семян
Гербициды на свеклу					
Синбетан эксперт ОФ, КЭ (112+91+71 г/л)	Свекла сахарная	Однолетние двудольные, в т.ч. Щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки.	1-3	759	Опрыскивание посевов в различные фазы развития сорняков
Клео, ВДГ (750 г/кг)	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	0,12	3245	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар листьев сорняков.
Клетодим плюс микс, КЭ (240 г/л)	Свекла сахарная	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	0,2-0,1	1320	Высота пырея 10-20 см не зависимо от фазы развития культуры в смеси ПАВ 0,7-1 л/га, фаза 2-6 листьев у сорняков не зависимо от фазы развития культуры в смеси с ПАВ 0,2-0,4 л/га
Карибу, СП (500 г/кг)	Свекла сахарная	Однолетние двудольные, в т.ч. Щирица и мать белая.	0,03	15400	Опрыскивание веге (тирующих сорняков)
Малибу, СП (500 г/кг)	Свекла сахарная	Однолетние двудольные, в т.ч. Щирица и мать белая.	0,03	7480	Опрыскивание вегетирующих сорняков
Гербициды на зерновые					
Артстар, ВДГ (750 г/кг)	Пшеница яровая, озимая, рожь, ячмень, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. Устойчивые к 2,4 Д (Вьюнок полевой и бодяк полевой)	0,015-0,025	4950	Опрыскивание посевов в фазе 2,3 листа-начала кушения культуры, озимые весной.
Римус, ВДГ (250 г/кг) Римсульфурон-метил	Кукуруза, картофель	Однолетние злаковые, двудольные, в т.ч. Устойчивые у 2,4 Д (вьюнок полевой и бодяк полевой)	0,05	7150	Фаза 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков.
Чисталан экстра, КЭ (420 г/л+60г/л)	Пшеница яровая, озимая, рожь, ячмень, овес, кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. Устойчивые к 2,4 Д (Вьюнок полевой и бодяк полевой)	0,6-0,9	275	Опрыскивание посевов в фазе 2,3 листа-начала кушения культуры, озимые весной, до выхода в трубку.
Ураган форте, ВР (500 г/л)	Пары, земли не сельскохозяйственного использования	Сплошного действия	1,5-2,5	363	Опрыскивание вегетирующих сорняков/
Инсектициды					
Альфашанс, КЭ (100 г/л)	Зерновые, сахарная свекла	Клоп черепашка, блошки, пядицы, тли, трипсы, цикадки	0,1-0,2	418	Опрыскивание в период вегетации
Лямбда-С, КЭ (50 г/л)	Зерновые, рапс, лен-долгунец	Хлебные жуки, трипс, блошки, цветоеды	0,15-0,2	396	Опрыскивание в период вегетации
Стимуляторы роста					
Альбит, ТПС (6,2+29,8+91,1+91,2+181,5 г/кг)	Зерновые технические, овощи, фрукты	Увеличивает энергию прорастания, устойчивость к засухе, сглаживает «гербицидную яму»	0,03	2090	Обработка при протравливании, или по вегетации одновременно с внесением препаратов